

Alertez les bébés !

C'est un phénomène peu connu : de nombreux bébés ont la coqueluche avant... d'avoir reçu le vaccin qui est censé les protéger ! Un rapport récent publié par la Fédération Wallonie-Bruxelles fait état d'une augmentation importante du nombre de cas de coqueluche au sein de la population de Wallonie et de Bruxelles. Un triplement des cas entre 2012 et 2013 est évoqué. Actuellement, il n'est pas

possible de distinguer la partie « réelle » de l'augmentation de la prévalence de la coqueluche de celle qui résulte d'une amélioration des systèmes de surveillance. Dans son rapport *Epidémie de coqueluche en 2013 en Wallonie, Belgique*, l'administration mentionne que, parmi les enfants de moins d'un an, la grande majorité (74 %) n'avait reçu aucune dose vaccinale. Elle observe que le plus grand nombre de cas de coqueluche déclarés se trouve chez les bébés d'un mois, soit avant la première dose de vaccin. Pour rappel, un enfant protégé est un enfant qui a reçu au moins les trois premières doses du schéma vaccinal (primo-vaccination à 2, 3 et 4 mois) et qui est correctement protégé par une couverture complète de 4 doses (rappel à 15 mois). De plus, les doses de rappel ultérieur sont importantes pour conserver une bonne immunité, notamment celle de 5-6 ans. La couverture de cette dose recommandée vers l'âge de 5-6 ans, mesurée via une enquête en 2e primaire en Fédération Wallonie-Bruxelles en 2011-2012 (soit à l'âge de 7 ans), était de 78,7 %. Pour rappel, le risque de développer une coqueluche est dix fois plus important lorsque les enfants ne sont pas correctement vaccinés. ■